

Utipro[®] plus^{AF}

Anwendungsbereich

Utipro[®] plus AF wird angewendet zur Kontrolle und Vorbeugung von Harnwegsinfekten (Blasenentzündungen), die durch Krankheitserreger wie E.coli und andere für gewöhnlich an der Entstehung von urologischen Infektionen beteiligte gramnegative Bakterien verursacht werden.

Das Medizinprodukt aus Xyloglucan (Hemicellulose) und Gelose wirkt mechanisch im Inneren des Darms, indem der Kontakt der Krankheitserreger mit der Darmschleimhaut und somit der erste Schritt zu ihrer Verbreitung und ihrem anschließenden Eindringen in die Harnwege unterbunden wird.

Utipro[®] plus AF wird ab dem Auftreten der ersten Symptome von Harnwegserkrankungen oral eingenommen, um die Vermehrung der Krankheitserreger zu vermindern, die zu Infektionen führen könnten.

Bei wiederkehrenden Infektionen wird Utipro[®] plus AF auch zur Vorbeugung von Rückfällen angewendet, bei denen die Vermehrung von Krankheitserregern zu wiederholten Harnwegsinfekten führt.

Packungsgrößen

Bliesterpackung mit 15 oder 30 Kapseln für Erwachsene.

Zusammensetzung

Xyloglucan, Gelose, Propolis, Hibiscus sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs) und Maisstärke.

Anwendungshinweise

Kapsel mit Flüssigkeit schlucken.

Dosierung

Bei Auftreten der ersten Symptome eines Harnwegsinfekts nehmen Patienten fünf Tage lang täglich 2 Kapseln Utipro[®] plus AF (1 Kapsel alle 12 Stunden).

Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Infekten wird täglich 1 Kapsel über mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage pro Monat eingenommen. Gegebenenfalls kann die Behandlung wiederholt werden.

Dieses Medizinprodukt ist für Erwachsene bestimmt.

Warnhinweise

- Die Diagnose eines Harnwegsinfekts (HWI) muss durch einen Arzt erfolgen.
- Ein akuter Harnwegsinfekt kann eine Behandlung mit Antibiotika erforderlich machen. Dieses Medizinprodukt hat keine bakterizide oder bakterienhemmende Wirkung und kann daher keine antibiotische Behandlung ersetzen. Utipro[®] plus AF kann jedoch gleichzeitig dazu verabreicht werden.
- Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Medizinprodukt nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit eingenommen werden, außer es wurde durch medizinisches Fachpersonal ausdrücklich verordnet.
- Verwenden Sie das Medizinprodukt nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfalldatum.
- Wenn die Bliesterpackung geöffnet oder beschädigt ist, darf das Medizinprodukt nicht verwendet werden.
- Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.
- Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen

Utipro[®] plus AF darf nicht bei Patienten angewandt werden, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan, Gelose oder einem anderen Bestandteil des Medizinprodukts bekannt ist.



NOVENTURE, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona - Spanien



Montavit

Vertrieb

Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstraße 96
6067 Absam (Österreich)



0476

Rev.03: 10.01.2020