

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Pelsana med Dexpanthenol - Salbe

Wirkstoff: Dexpanthenol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden nicht verbessern oder gar verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Pelsana med Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Pelsana med Salbe beachten?
3. Wie ist Pelsana med Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pelsana med Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST PELSANA MED SALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Pelsana med Salbe enthält als Wirkstoff Dexpanthenol. Dexpanthenol wird rasch in die Haut aufgenommen und in Pantothenensäure umgewandelt, die auch als „Hautvitamin“ bezeichnet wird. Sie wirkt wundheilungsfördernd und entzündungshemmend und spielt eine wesentliche Rolle im Zellstoffwechsel.

Pelsana med Salbe wird angewendet:

- Zur Förderung der Wundheilung bei leichten Verletzungen.
- Zur Behandlung von Hautreizungen (z.B. Juckreiz, Sonnenbrand, Erfrierungen) sowie begleitend bei Neurodermitis (eine chronische Hauterkrankung).
- Zur Vorbeugung und Behandlung von trockener, rissiger oder spröder Haut.
- In der Säuglingspflege zur Vorbeugung und Behandlung von Wundsein (Hautrötungen, Windelentzündungen).
- Bei stillenden Müttern zur Vorbeugung und Behandlung von wunden Brustwarzen.

Wenn sich Ihre Beschwerden nicht verbessern oder gar verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON PELSANA MED SALBE BEACHTEN?

Pelsana med Salbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Dexpanthenol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie allergisch gegen Hydroxybenzoesäureester bzw. verwandte Stoffe (Paragruppenallergie) sind.
- wenn Sie allergisch gegen Soja oder Erdnuss sind (enthält Sojalecithin).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Pelsana med Salbe anwenden. Bei der Behandlung mit Pelsana med Salbe im Genital- oder Analbereich kann es wegen des Hilfsstoffes weiße Vaseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Anwendung von Pelsana med Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Pelsana med Salbe kann während der Schwangerschaft und Stillperiode angewendet werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels vorsichtshalber Ihren Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Auswirkungen bekannt.

Pelsana med Salbe enthält Propylenglycol, Stearylalkohol, Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat.

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Stearylalkohol kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST PELSANA MED SALBE ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Anwendung auf der Haut.

Pelsana med Salbe je nach Bedarf mehrmals täglich auf die gereinigte Wunde, geschädigte Haut oder Schleimhaut auftragen.

In der Säuglingspflege nach jedem Trockenlegen über Gesäß und Genitalregion des Säuglings verteilen, nachdem diese Körperstellen gründlich mit Wasser gereinigt wurden. Bei stillenden Frauen nach jedem Stillen Pelsana med Salbe auf ein Stück Gaze aufbringen und die Brustwarzen damit bedecken.

Ältere Personen (über 65 Jahre) sowie Patienten mit Leber- und Nierenfunktionsstörungen: Eine Dosisanpassung ist nicht notwendig.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In sehr seltenen Fällen (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen) treten allergische Hautreaktionen (z.B Rötung, Brennen, Jucken) auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im

Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

Österreich

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: [http:// www.basg.gv.at](http://www.basg.gv.at)

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST PELSANA MED SALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem ersten Öffnen 6 Monate haltbar.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Pelsana med Salbe enthält

- *Der Wirkstoff ist:* Dexpanthenol.
100 g Salbe enthalten 5,5 g Dexpanthenol.
- *Die sonstigen Bestandteile sind:* Propylenglycol, Stearylalkohol, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Phenoxyethanol, gereinigtes Wasser, Oleum Helianthi annui (Sonnenblumenöl), Vaseline weiß, Lecithinum vegetabile (Sojalecithin), Sorbitanstearat, Macrogolstearat (Polyoxyl 40 stearate), Carbomer, Natriumhydroxid, α -Tocopherol.

Wie Pelsana med Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Pelsana med Salbe ist eine beige schimmernde, homogene Salbe.
Aluminiumtube zu 20 g und 100 g

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
Wolfganggasse 45-47
A-1121 Wien
Tel: 01 81158
Fax: 01 81158-7
e-mail: office@schmidgall.at

Z.Nr.: 1-31692

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2017.